22 марта в Хабаровске проведен традиционный круглый стол, посвященный WKD, организованный Профильной комиссией по нефрологии МЗ РФ и ПАН. Последние несколько лет, мероприятие проводится без финансовой поддержки компаний, тем отраднее, что коллеги стремятся к общению, обмену опытом, неформальному общению за дружеским столом по окончании научной Программы. Традиционно приняла участие в мероприятии заведующая кафедрой внутренних болезней, гериатрии и инструментальной диагностики ДВГМУ проф. Н.В. Воронина. Впервые приняли участие детские нефрологи. Собственный опыт всегда ценен: им поделились коллеги из ж/д больницы и ККБ №1.

Тубулоинтерстициальный нефрит


Частота ОТИН в зависимости от причинных факторов
• НПВС - 44-75%
• АНТИБИОТИКИ- 33-45%
• Относительный риск развития ОТИН при приеме НПВС составляет 1,6–2,2%, а в возрасте старше 66 лет возрастает до 13,3%.
• ОТИН развивается как вследствие применения неселективных, так и селективных НПВС

ржд·медицина
Причины поражения почек при онкологических заболеваниях
Непосредственно опухолевая инфильтрация
Повреждение почечной ткани метаболитами опухоли
Вторичные гломерулярные поражения (чаще ассоциированы с паранеопластическим синдромом)
Нефротоксичное действие лекарственных препаратов и лучевой терапии
Синдром лизиса опухоли

Актуальность вопроса
Синдром Сагликера – это редкая форма почечной остеодистрофии у пациентов с длительно некомпенсированным вторичным гиперпаратиреозом (ВГПТ) на фоне терминальной стадии хронической болезни почек 5-й стадии (ХБП5).
Основная причина синдрома – отсутствие своевременной диагностики и лечения ВГПТ.
По состоянию на 2012 год в литературе сообщалось о шестидесяти случаях данного заболевания.
Совокупность данных признаков в 2004 году была выделена Сагликером в одноименный синдром.
В отечественной литературе описано всего два клинических случая наблюдения данного синдрома.

Рациональное вскармливание является одним из **наиболее важных факторов** для оптимального развития и здоровья ребенка
Еще в 1941 году в книге для родителей академик Г.Н Сперанский писал о том, что «для правильного обмена веществ необходимо рациональное вскармливание, т.е. пища, получаемая ребенком, должна иметь соответствующую калорийную ценность и содержать все основные ингредиенты - белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и воду не только в достаточном количестве, но и в определенных соотношениях»
Масса тела при рождении — индикатор состояния здоровья

GLOBAL
BURDEN
OF DISEASE

GLOBAL
BURDEN
OF DISEASE